

Serie: Elementaire onderwerpen van hoger standpunt uit.

17 October ; voordracht door

H.J.A. Duparc

over:

Enige toepassingen van de stelling van Casey uit de vlakke meetkunde.

De stelling van Ptolemaeus zegt dat voor 4 punten A, B, C en D, gelegen op een cirkel R, waarbij A en C door B en D worden gescheiden, geldt

$$t_{AC}t_{BD} = t_{AD}t_{BC} + t_{AB}t_{CD}.$$

Hierin geeft  $t_{AB}$  de afstand van A en B aan.

De stelling van Casey zegt, dat deze relatie ook blijft bestaan, als de vier punten worden vervangen door vier cirkels, die allen aan R raken, en hun afstanden door de lengten van hun gemeenschappelijke raaklijnen. Hierbij neme men de gemeenschappelijke uitwendige of inwendige raaklijn, alnaargelang die twee cirkels gelijksoortig of ongelijksoortig aan R raken.

Deze stelling volgt uit de stelling van Ptolemaeus.

Beschouw nl. 4 cirkels A, B, C en D, die b.v. alle uitwendig raken aan R in de punten A', B', C', resp. D' met stralen a, b, c en d. Zij r de lengte van de straal van R. Dan heeft men zoals men meetkundig of algebraïsch gemakkelijk inziet

$$t_{AB} = t_{A'B'} \sqrt{\left(1 + \frac{a}{r}\right)\left(1 + \frac{b}{r}\right)}, \text{ enz.}$$

waarna uit de Ptolemaeusrelatie onmiddellijk de Caseyrelatie volgt.

Men kan de stralen a, b, c en d tot nul laten naderen, waarna de Caseyrelatie weer overgaat in de Ptolemaeusrelatie. Van belang blijken ook die gevallen, waarbij een of meer, maar niet alle stralen a, b, c en d gelijk zijn aan nul.

Wij geven nu een aantal toepassingen van de stelling van Casey en bewijzen allereerst de volgende stelling:

Beschouw een driehoek ABC met zijn twee aangeschreven cirkels  $I_a$  en  $I_b$ . Laat een willekeurige cirkel U gelijksoortig raken aan deze cirkels. De vier snijpunten van cirkel U en de voldoende verlengde zijden AC en BC zijn dan de hoekpunten van een volledige vierhoek, waarvan twee overstaande zijden evenwijdig lopen met de beide uitwendige gemeenschappelijke raaklijnen van de cirkels  $I_a$  en  $I_b$ .

Voor het bewijs passe men de stelling van Casey toe op de figuur  $I_a P Q I_b$ . Hierin is P een snijpunt van de cirkel U en BC en Q dat snijpunt van cirkel U en AC, waarvoor de figuur  $I_a P Q I_b$  in de neergeschreven volgorde een Casey-figuur is. Dan heeft men volgens Casey

$$(CQ+s-b)(CP+s-a) = PQ(a+b) + (CP-s+b)(CQ-s+a), \text{ dus } (CP+CQ):PQ = (a+b):c,$$

dus PQ is parallel of antiparallel met AB. In het laatste geval loopt PQ evenwijdig met de andere gemeenschappelijke uitwendige raaklijn van de cirkels  $I_a$  en  $I_b$ .

Wij gaan nu iets precieser de relatie tussen PQ en AB na. Hiertoe houden wij de driehoek ABC en zijn aangeschreven cirkels vast, maar laten de cirkel U variëren (deze blijft echter gelijksoortig raken aan de cirkels  $I_a$  en  $I_b$ ). Cirkel U snijdt BC in 2 punten; door het ene gaat zoals in de zójuist bewezen stelling bleek, een koorde evenwijdig met AB (dat punt noemen wij een P-punt), door het andere een koorde antiparallel met AB (dat punt noemen wij een R-punt). Tussen de afstanden CP en CR bestaat een bilineair verband, dat men onmiddellijk vindt door op de figuur  $I_b P I_a R$  de stelling van Casey toe te passen.

Beweegt dus cirkel U, dan doorlopen P en R collocale projectieve puntenreeksen. Het projectieve verband tussen P en R is hyperbolisch want R valt met P samen zowel indien P gekozen wordt in het raakpunt  $T_a$  van cirkel  $I_a$  en BC als in het raakpunt  $U_a$  van cirkel  $I_b$  en BC.

Laten wij nu cirkel U, dus P, bewegen over BC. Valt P in B, dan is R oneigenlijk; loopt P van B naar  $U_a$ , dan beweegt R zich via B naar  $U_a$  en haalt hier P in. Loopt P van  $U_a$  naar  $T_a$ , dan blijft steeds R liggen tussen  $T_a$  en P om pas weer in  $U_a$  door P te worden ingehaald. Is P oneigenlijk, dan ligt R in het snijpunt S van BC en de andere uitwendige gemeenschappelijke raaklijn van cirkel  $I_a$  en  $I_b$ . Wij vinden dus:

Snijdt een cirkel U, die de aangeschreven cirkels  $I_a$  en  $I_b$  van een driehoek ABC gelijksoortig raakt, de zijde BC ten minste eenmaal tussen B en C, dan ligt het op BC door cirkel U bepaalde P-punt dichterbij het raakpunt  $U_a$  van cirkel  $I_a$  en BC, dan het R-punt.

Hieruit volgt onmiddellijk de stelling:

De cirkel N, die de drie aangeschreven cirkels van een driehoek uitwendig raakt, is de negenpuntscirkel van die driehoek.

Allereerst merke men op dat cirkel N, ieder der zijden van de driehoek in ten minste één punt zelf moet snijden. (Immers cirkel N raakt cirkels  $I_a$  en  $I_b$  uitwendig, dus P ligt tussen B en S; zou P niet tussen B en C liggen, dan lag P tussen C en S en ook R lag op het aan de zijde van C verlengde deel van BC; ongelijke redenen zouden echter P en R op het aan de zijde van B verlengde deel van BC moeten liggen.)

Zoek nu de 3 snijpunten van cirkel N en de zijden op, die het dichtste liggen bij de raakpunten der aan die zijden aangeschreven cirkels.

Deze vormen dan een driehoek waarvan de zijden parallel zijn met die van driehoek ABC; de 3 snijpunten zijn dus de middens der zijden van driehoek ABC. Cirkel N is dus de negenpuntscirkel van driehoek ABC. De overige 3 snijpunten van cirkel N en de zijden van driehoek ABC vormen een driehoek, waarvan de zijden antiparallel zijn met die van driehoek ABC, zodat cirkel N ook gaat door de voetpunten der hoogtelijnen van driehoek ABC.

Uit de omkering van de stelling van Casey blijkt tenslotte nog, dat de cirkel N ook raakt aan de ingeschreven cirkel van driehoek ABC.

Men kan zich afvragen, welke de 8 raakcirkels zijn der 3 aangeschreven cirkels van driehoek ABC. Bekend zijn:


- 1<sup>o</sup>: de drie zijden van de driehoek zelve.
- 2<sup>o</sup>: de negenpuntscirkel N.

Wij kunnen nu zoeken naar de 4 overige raakcirkels. Zoals bekend ontstaan die uit de bovenopgesomde 4 cirkels door een inversie die de cirkels  $I_a, I_b$  en  $I_c$  invariant laat (dus een inversie ten opzichte van hun gemeenschappelijke orthogonaalcirkel T).

Hiertoe onderzoeken wij eerst de ligging van die cirkel T. Men heeft de volgende gemakkelijk te bewijzen eigenschappen:

Projecteer A, B en C op de buitenbisectrices van driehoek ABC. De zes voetpunten liggen dan op één cirkel, de cirkel van Taylor van driehoek  $I_a I_b I_c$ . Het middelpunt T ervan ligt zo op het verlengde van ZI, dat  $TZ = \frac{1}{2}ZI$  (I is middelpunt ingeschreven cirkel en Z is zwaartepunt van driehoek ABC). De cirkel van Taylor staat inderdaad loodrecht op elk der cirkels  $I_a, I_b$  en  $I_c$ . De uit cirkel N door inversie ten opzichte van cirkel T ontstane raakcirkel U heeft zijn middelpunt dus op de rechte TN, dat is op de rechte door N evenwijdig met OI (O centrum omgeschreven cirkel van driehoek ABC). De cirkel U raakt  $I_a, I_b$  en  $I_c$  inwendig. De eerst afgeleide stelling leert ons dat deze de verlengden der zijden van driehoek ABC snijdt in 6 punten, drie verbindingslijnen waarvan evenwijdig lopen met de zijden van driehoek ABC. (Drie der andere zijden van de zeshoek dier 6 punten lopen antiparallel met de zijden van driehoek ABC en blijken, alweer door Casey toe te passen, een lengte s te bezitten.) Een gevolg hiervan is dat de cirkel U zijn middelpunt heeft op de rechte OK (K snijpunt der symmedianen van driehoek ABC).

Trekt men nl. door K rechten evenwijdig met de zijden van driehoek ABC, dan heeft men (zie tekening)  $B_1 A_2$  antiparallel AB. Liggen V en W op cirkel U en is VW antiparallel met AB en  $VW = s$ , dan ligt het midden Y van VW op CK en men heeft voor het snijpunt U van OK en de middenloodlijn van VW de evenredigheid



$$UK:OK=YK:CK=(YC+2CD):2CD=\frac{s}{2B_1A_2} + 1.$$

Verder is

$$BC_0 = \frac{a^2c}{a^2+b^2} ; KA_3 = \frac{a^2c}{a^2+b^2+c^2} ; B_1C = \frac{a^2b}{a^2+b^2+c^2} ; B_1A_2 = \frac{abc}{a^2+b^2+c^2}.$$

Dus UK is symmetrisch in a, b en c, dus het punt U is middelpunt van de gezochte raakcirkel.

Wij drukken verder de straal u van cirkel U uit in de elementen van driehoek ABC. Allereerst maken wij hiertoe op dat voor de straal t van de cirkel T van Taylor geldt  $4t^2=r^2+s^2$ , zoals meetkundig direct blijkt uit het feit dat een koorde ter lengte s van die cirkel op een afstand  $\frac{1}{2}r$  gelegen is van zijn middelpunt.

Laat nu TN de negenpuntscirkel snijden in X en Z. Door inversie met T als centrum gaan X en Z over in twee tegenpunten X' en Z' van cirkel U, dus de straal u van cirkel U is gelijk aan

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2}X'Z' = \frac{1}{2}(X'T + Z'T) = \frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{XT} + \frac{t^2}{ZT}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{\frac{1}{2}R-TN} + \frac{t^2}{\frac{1}{2}R+TN}\right) = \frac{2t^2R}{R^2-4TN^2} = \\ &= \frac{2t^2R}{R^2-OI^2} = \frac{2t^2R}{2rR} = \frac{t^2}{r} = \frac{r^2+s^2}{4r}. \end{aligned}$$

Voor de straal  $u_a$  van de raakcirkel, die door inversie ten opzichte van cirkel T uit de zijde BC ontstaat, vindt men

$$u_a = \frac{t^2}{2e},$$

waarin e de afstand aangeeft van T tot de zijde BC. Zij f de afstand van Z tot BC dan heeft men op grond van de ligging der punten T, Z en I

$$r+2e=3f=\frac{2O'I}{c},$$

dus

$$e = \frac{O'I}{c} - \frac{O'I}{a+b+c} = \frac{O'I(a+b)}{c(a+b+c)} = \frac{r(a+b)}{2c},$$

dus

$$u_a = \frac{t^2c}{r(a+b)} = \frac{(r^2+s^2)c}{4r(a+b)}, \text{ enz. cycl.}$$

Analoge beschouwingen geven ons de cirkels die raken aan de cirkels I,  $I_a$  en  $I_b$ , welke blijken te zijn:

De drie zijden van de driehoek; de negenpuntscirkel; de hieruit door inversie te vinden cirkels waarvan er weer drie gaan door het centrum van inversie, dat is het middelpunt  $T_a$  van de cirkel van Taylor van driehoek  $II_aI_b$ . De vierde cirkel heeft zijn middelpunt nu liggen op de rechte  $T_aN$  en de rechte OK.

Op de rechte OK vindt men de volgende 15 merkwaardige punten:

O, K, L (centrum cirkel van Lemoine),  $\Omega$  (midden der verbindingsrechte\*) der punten van Brocard  $\Omega_1$  en  $\Omega_2$ ), centra van 4 raakcirkels, door inversie uit de negenpuntscirkel te vinden;

\*) Verg. Rapport ZW 1950-002 van G.W.Decnop uit deze serie.